

CurcuDyn

CNK 3188257

 60 softgels**0,00 €** (Adviesprijs)

Voor soepele gewrichten en spieren en ter ondersteuning van het kraakbeen

- Bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract (gepatenteerde miceltechnologie): 1350x beter opneembaar dan standaard kurkumapoeder (wortel)
- Cofactoren die synergetisch werken met kurkuma: gember, vitamine C en vitamine D
- Gember: voor soepele gewrichten
- Vitamine D: ter ondersteuning van de spieren
- Vitamine C: ter ondersteuning van het kraakbeen
- Hoge tolerantie
- Mag ingezet worden bij polygemediceerde oudere personen

Gebruik: 2 capsules per dag

Producteigenschappen

Meer weten over CurcuDyn®? Ga naar www.curcudyn.eu.

CurcuDyn® bevat een kurkuma-extract en gemberextracten die bijdragen tot het behoud van soepele gewrichten. CurcuDyn® bevat ook vitamine D die bijdraagt tot de instandhouding van de normale werking van de spieren, en vitamine C die bijdraagt tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het kraakbeen en van de bloedvaten.



Sojavrij



Lactosevrij



Glutenvrij

Ingrediënten

Ingrediëntenoverzicht

| Ingrediënten per 2 capsules | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
|---|-----------------|-------------|------|
| Kurkumawortelextract (Curcuma longa L.) | | 105 mg | |
| | Curcuminoïden | 100 mg | |
| Gemberextract (Zingiber officinale Rosc.) | | 20 mg | |
| Vitamine C | Ascorbinezuur | 16 mg | 20% |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 5 µg | 100% |

Bevat ook: Polysorbaat 80, Gelatine, Glycerol, Ijzeroxide

Gebruik en dosering

2 capsules per dag

Voorzorgen

Niet aangewezen bij gebruik van orale anticoagulantia en obstructie van de galwegen. Onderbreek het gebruik in geval van aanhoudende diarree.

Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar, zwangere vrouwen en tijdens de borstvoeding. In geval van lever- en galwegaandoeningen wordt het gebruik afgeraden.

Veelgestelde vragen over dit product

Vanaf welke leeftijd kunnen CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte gebruikt worden?

CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte kan gebruikt worden vanaf 18 jaar of zoals aanbevolen door uw arts.

Wat zijn de neveneffecten van CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte?

CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte worden over het algemeen goed verdragen.

Kunnen CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte ontstekingsremmers vervangen?

CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte zijn voedingssupplementen en kunnen helpen om de gewrichten te ondersteunen. CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte kunnen in bepaalde gevallen in combinatie met ontstekingsremmers gebruikt worden. Raadpleeg hiervoor echter een arts alvorens dit op te starten

Hoe lang dient men CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte in te nemen alvorens effect te hebben?

Het is aangewezen CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte minimaal 2 weken te gebruiken

Waarom worden cofactoren aan CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte toegevoegd?

Cofactoren verbreden de werking van het product.

Kurkuma wordt moeilijk door het lichaam opgenomen. Bemoedigt het toevoegen van extra ingrediënten dan de opname niet?

Nee, integendeel. De cofactoren verbreden de werking van CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte en hebben geen nadelig effect op de biologische beschikbaarheid.

Wat is het voordeel van bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract?

Kurkuma is vetoplosbaar. Zonder optimalisatie zou u dagelijks zeer grote hoeveelheden kurkuma moeten innemen om effect te voelen.

Ik heb last van mijn spieren. Kan CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte me helpen?

Mogelijks is MetaRelax® meer aangewezen. MetaRelax® is een magnesiumcomplex op basis van magnesiumglycerofosfaat dat ondersteuning biedt voor de spieren. MetaRelax® wordt bovendien bijzonder goed verdragen in maag en darmen.

Mag CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte genomen worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding?

CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte bevatten plantenextracten waardoor voorzichtigheid is geboden. Vraag advies aan uw arts alvorens CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte in te nemen.

Ik gebruik antistollingsmiddelen. Mag ik CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte nemen?

Kurkuma kan een invloed hebben op de bloedstollingsparameters. Dit effect is niet altijd wenselijk. Als CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte samen genomen wordt met antistollingsmiddelen (anticoagulantia) dan kan dit een bijkomend bloedverdünnend effect hebben. Dit effect is afhankelijk van het type antistollingsmiddel. Het is om die reden noodzakelijk uw arts te contacteren en zijn advies te vragen alvorens CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte samen met antistollingsmiddelen te nemen.

Mag CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte samen genomen worden met glucosamine, chondroïtine, MSM...?

Ja, deze combinatie kan in bepaalde gevallen nuttig zijn.

Zijn er situaties waarbij CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte niet aangewezen zijn?

CurcuDyn® en CurcuDyn® zijn niet aangewezen bij **zwangerschap, borstvoeding**, gebruik van **orale anticoagulantia** en **obstructie** van de **galwegen**. Bespreek in deze gevallen het gebruik eerst met uw arts of apotheker. Onderbreek het gebruik **in geval van aanhoudende diarree**.

Wat is het verschil tussen CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte?

CurcuDyn® is een hoog gedoseerd, bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract aangevuld met gember, vitamine C en vitamine D. Om de opneembaarheid van kurkuma te verhogen, wordt de miceltechnologie gebruikt. **Gebruik:** 2 capsules per dag.

CurcuDyn® Forte bevat ook nog een 3e goed bestudeerde plant: het Boswellia serrata-extract. Zo biedt CurcuDyn® Forte een synergetische combinatie van 3 krachtige plantenextracten om de gewrichten soepel te houden. Om de opneembaarheid van kurkuma én boswellia te verhogen, wordt gebruik gemaakt van een plantaardig complex op basis van fenegriek waarbij de nutriënten gespreid vrijkomen. **Gebruik:** 1 capsule per dag.

Wie heeft er baat bij gebruik van CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte?

Iedereen die zijn gewrichten soepel wenst te houden.

De informatie werd geschreven door en is bestemd voor mensen die beroepsmatig met gezondheid en voeding bezig zijn. Ze is niet bestemd of bedoeld voor leken/consumenten. De diagnose en behandeling van de ziekte moet gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een erkende gezondheidsprofessional.

© 2020 Metagenics